

هشدار درخصوص عوارض ناشی از مصرف دگزامتاژون تزریقی

به اطلاع همکاران محترم میرساند مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR)، تا پایان سال 1389 تعداد 349 مورد گزارش از عوارض داروی دگزامتاژون تزریقی دریافت نموده است که در بسیاری از موارد، به دلیل مصرف نابجای فرآورده، قابل پیشگیری تشخیص داده شده است. لذا توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می نماید:

- 1 - با توجه به اینکه علت مصرف این فرآورده در گزارش‌های ارسالی به مرکز ADR در بسیاری از موارد سرماخوردگی، درد دندان، سردرد، تب، و یا سوء مصرف در ورزشکاران ذکر شده است، خاطر نشان می سازد که دگزامتاژون تزریقی بایستی صرفاً در موارد دارای اندیکاسیون مورد تأیید در منابع علمی تجویز گردد و از مصرف این فرآورده در موارد فوق الذکر جداً اجتناب شود.
- 2 - تجویز وریدی یا عضلانی دگزامتاژون صرفاً به موارد اورژانس یا مواردی که درمان خوراکی امکانپذیر نیست، محدود می باشد. این داروی تزریقی به هیچ وجه در درمان علائم سرماخوردگی اندیکاسیون ندارد. بدیهی است مصرف فرآورده های دارویی در مواردی به جز اندیکاسیون های مصوب دارو، صرفاً بیمار را در معرض خطر ابتلا به عوارض دارویی قرار می دهد، بدون اینکه اثربخشی مفیدی دریافت نموده باشد.
- 3 - از جمله عوارض گزارش شده به این مرکز می توان به واکنشهای محل تزریق از جمله درد، التهاب و آبسه در محل تزریق، خارش، تهوع، سرگیجه، گرگرفتگی، استفراغ، ضعف، سکسکه، کهیر، پارستزی، راش، افزایش تعزیری، اختلالات بینیایی، ادم، افزایش فشارخون، هایپوکالمی، فلچ شل گذرا، تاکیکاردی، ترمور، بیقراری، تشنج، هایپرگلیسمی، دیس تونی، شوک آنافیلاکتیک، میالژی، یرقان، درد شکم، خونریزی گوارشی، قرمزی و ادم صورت، پلی اوری، افسردگی، افزایش وزن، سایکوز، توهمندی، لارنژیت، واژینیت و بیخوابی اشاره نمود.
- 4 - از جمله عوارض ذکر شده در منابع علمی در اثر مصرف گلوکوکورتیکوئیدها از جمله دگزامتاژون می توان به موارد زیر اشاره نمود:

نارسایی آدرنولوکوتیکال، ضعف عضلانی، درد عضلانی، تأخیر در ترمیم زخمها، شکستگی استخوان، پوکی استخوان، افزایش خطر ابتلا به عفونتها، برهم خوردن تعادل مایع و الکتروولیت های بدن، عوارض چشمی نظیر کاتاراكت، عوارض گوارشی نظیر پپتیک اولسر، عوارض عصبی همچون نوروپاتی ایسکمیک، تشنج، افسردگی و عوارض پوستی همچون پتشی، اکیموز، هایپر یا هایپوپیکمانانتاسیون، آترووفی پوست، تلانژکتازی، آبسه استریل، سارکوم کاپوزی و آنافیلاکسی.

از همکاران محترم تقاضا می شود در صورت مشاهده هر گونه عارضه یا اشتباہ دارویی، مراتب را از طریق تکمیل فرم های زرد و ارسال به صندوق پستی ۹۴۸-۱۴۱۸۵ و یا از طریق سایت www.fdo.behdasht.gov.ir، نمبر (88890857) یا تماس تلفنی (4-88923193) به مرکز ADR گزارش نمایند.