



اشتباه در مقدار مصرف لووستیریزین (Levocetirizine)

به اطلاع همکاران محترم می‌رساند، مرکز ADR گزارش‌هایی مبنی بر اشتباه در تحویل قرص لووستیریزین ۵ میلی‌گرمی به جای قرص ۵ میلی‌گرمی ستیریزین بدون تنظیم دوز دریافت داشته است. با توجه به تفاوت‌های این دو دارو از نظر مقدار مصرف، توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می‌نماید:

۱. ستیریزین یک آنتی‌هیستامین راسمیک دارای دو ایزومر چپ‌گرد (لووستیریزین) و راست‌گرد (دکستروستیریزین) می‌باشد که اثرات آنتی‌هیستامینی ستیریزین مربوط به ایزومر لووستیریزین می‌باشد.

۲. از آنجایی که ستیریزین حاوی مقادیر مساوی از هر دو انانتیومر می‌باشد، مقدار مصرف توصیه شده از لووستیریزین در گروه‌های سنی مختلف نصف مقدار مصرف ستیریزین می‌باشد. لذا مصرف روزانه ۵ میلی‌گرم لووستیریزین را نمی‌توان جایگزین مصرف ۵ میلی‌گرم در روز ستیریزین نمود، زیرا این مقدار معادل مصرف ۱۰ میلی‌گرم در روز ستیریزین می‌باشد.

۳. مجدداً تأکید می‌شود در صورت ارائه یا مصرف لووستیریزین به جای ستیریزین، حتماً به دوز تجویز شده ستیریزین توجه نمایید. در صورتی که مقدار مصرف تجویز شده برای بیمار ۵ میلی‌گرم ستیریزین در روز باشد، نمی‌توان مقدار ۵ میلی‌گرم در روز لووستیریزین را به جای آن مصرف نمود.

از همکاران محترم تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هر گونه عارضه یا اشتباه دارویی، مراتب را از طریق تکمیل فرم‌های زرد و ارسال به صندوق پستی ۹۴۸-۱۴۱۸۵ و یا از طریق سایت www.fdo.ir، نمابر (۸۸۸۹۰۸۵۷) یا تماس تلفنی (۴-۸۸۹۲۳۱۹۳) به مرکز ADR گزارش نمایند.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها
معاونت غذا و دارو - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی