

داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و خطر ایجاد عفونت های فرصت طلب

بیماران مصرف کننده داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی در معرض افزایش خطر ابتلا به عفونت های فرصت طلب، مانند فعال شدن عفونت های ویروسی نهفته، از جمله نفروپاتی ناشی از BK ویروس می باشند. پایش این عارضه و مداخله زود هنگام گروه پزشکی در این خصوص، امری حیاتی است و ممکن است تنظیم مقدار مصرف داروی تجویز شده برای بیمار ضروری باشد.

به اطلاع همکاران محترم می رساند که به تازگی labeling داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی به منظور به روز رسانی اطلاعات مربوط به افزایش خطر عفونت های فرصت طلب ناشی از مصرف این داروها، تغییر نموده است.

این تغییر labeling بر مبنای درخواست سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) از شرکت های سازنده فرآورده های مذکور صورت گرفته است و طی آن بر افزایش خطر ابتلای بیماران مصرف کننده داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی به عفونت های فرصت طلب، مانند فعال شدن عفونت های ویروسی نهفته، از جمله نفروپاتی ناشی از BK ویروس، تاکید شده است. تغییر labeling ذکر شده برای داروهای سیرولیمویس، سیکلوسپورین، مایکوفنولات موفتیل و مایکوفنولیک اسید اعمال شده است.

FDA در حال بررسی بیشتر ارتباط میان نفروپاتی ناشی از BK ویروس و مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی می باشد. وقوع نفروپاتی ناشی از BK ویروس در درجه اول در بیماران پیوند کلیه مشاهده شده است. نفروپاتی ناشی از BK ویروس می تواند تا مرحله رد پیوند کلیه پیشروی نماید. پایش این خطر جدی و مداخله زود هنگام گروه پزشکی در این خصوص حیاتی است و ممکن است تنظیم مقدار مصرف داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی در این بیماران ضروری باشد.

از همکاران محترم تقاضا می شود در صورت مشاهده هر گونه عارضه یا اشتباه دارویی، مراتب را از طریق تکمیل فرم های زرد و ارسال به صندوق پستی ۹۴۸-۱۴۱۸۵ و یا از طریق سایت www.adrmc.ir، نمابر (۸۸۸۹۰۸۵۷) یا تماس تلفنی (۴-۸۸۹۲۳۱۹۳) به مرکز ADR گزارش نمایند.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها
معاونت غذا و دارو - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی